

芝用殺虫剤

# エンバー<sup>®</sup>MC

®は住友化学(株)の登録商標です。

芝の害虫防除は  
新しい液剤タイプの  
マイクロカプセルで!!



シバオサゾウムシ



シバツトガ



スジキリヨトウ



コガネムシ



タマナヤガ



大地のめぐみ、まっすぐ人へ  
**SCC GROUP**  
住友化学アグログループ

販売  **レインボー薬品株式会社**  
本社 〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10  
TEL. 03-6740-7777



## 芝用殺虫剤

# エンバー<sup>®</sup>MC

農林水産省登録 第18347号

成分: ペルメトリン 10.0%

性状: 類白色粘稠液体

種類: ペルメトリンマイクロカプセル剤

毒性: 普通物(毒物、劇物に該当しないものを指していう通称)

残効

速効

エンバーMCは、ピレスロイド系化合物ペルメトリンを有効成分とする殺虫剤で、

住友化学が独自の処方により開発した、全く新しい液剤タイプのマイクロカプセル製剤です。

マイクロカプセル化により、残効性・耐雨性の向上、魚毒性・薬害の軽減を可能にしました。

また、有効成分にピレスロイドを用いたことにより、速効性、忌避作用という

特長を有し、高い効果を発揮します。

忌避作用

## 適用害虫と使用方法

2018年6月現在の登録内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数
芝	シバツトガ	1000 ~2000倍	0.3ℓ/m <sup>2</sup>	発生初期	3回以内	散布	3回以内
	スジキリヨトウ		0.2~0.3ℓ/m <sup>2</sup>				
	シバオサゾウムシ成虫	0.3ℓ/m <sup>2</sup>					
	タマナヤガ	2000倍					
	コガネムシ類幼虫	500倍	0.5ℓ/m <sup>2</sup>				
		ケラ	1000倍				
			0.5ℓ/m <sup>2</sup>				

### ⚠️ 効果・薬害等の注意

- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### ⚠️ 安全使用上の注意

- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

- 桑葉にかからないように注意。(蚕毒)
- ミツバチに対する注意
  - ・ 巣箱及びその周辺にかからないようにする。

- 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

- 魚毒性等・・・河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意。(甲殻類)
- 使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

- 治療法・・・メトカルバモール製剤の投与が有効。(動物実験で報告)
- 保管・・・密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。