



# 効果持続期間 **7**年

豊富なデータが裏付ける確かな効果で  
皆様の信頼に応えてきた  
グリーンガード・NEOは  
7年間の薬効期間という  
新たな時代の夜明けを迎えました。



松枯れ防止・樹幹注入剤

**グリーンガード®・NEO**  
**Greenguard® NEO**

松枯れ防止・樹幹注入剤

# グリーンガード®・NEO



製 品 要 概	農林水産省登録	第22028号
	農 業 の 種 類	酒石酸モランテル液剤
	物理化学的性状	黄色水溶性液体
	有 効 成 分	トランス-1,4,5,6-テトラヒドロ-1-メチル-2-(2-(3-メチル-2-チエニル)ビニル)ピリミジン酒石酸塩……………20%
	その他の成分	水・有機溶剤等……………80%
	包 装	90mL×50本入り

## 病害虫の範囲および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	酒石酸モランテルを含む農薬の総使用回数
まつ (生立木)	マツノザイセンチュウ	胸高直径(樹幹部) 10~15 cm 90mL 15~20 cm 135mL 20~25 cm 180~270mL 25~30 cm 270~360mL 30~35 cm 360~450mL 35~40 cm 450~540mL 40cm以上は5cm増すごとに 0.5~1.5アンブルを順次増量	マツノマダラカミキリ 成虫発生3ヶ月前まで	1回	樹幹注入	1回

## グリーンガード・NEO 7年間継続効果試験 林業薬剤協会委託試験


試験期間▶ 2004年~2010年

試験機関▶ 静岡農林技術研究所 森林・林業研究センター、石川県林業試験場、熊本県林業研究指導所、(独)森林総合研究所 九州支所

### グリーンガード・NEO



### 対 照 区



※1): グリーンガード・NEO区の1年目の枯損原因は不明

※2): グリーンガード・NEO区の3年目試験開始前に、2本の松が誤って伐採されていることが発見されたため、評価木合計は36本

※3): グリーンガード・NEO区の6年目試験開始前に、1本の松が誤って伐採されていることが発見されたため、評価木合計は35本

\* 供試木: アカマツ、クロマツ

**Pfizer** ファイザー株式会社  
〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

グリーンガードホームページ ▶ [www.greenguard.jp/](http://www.greenguard.jp/)