

チョウ目害虫に即効！しかも長持ち

スピネアタック®



アメリカ
シロヒトリにも



マイマイガにも

1

天然物由来の有効成分「スピネトラム」

同系統薬剤が少なく、ローテーションに最適

2

チョウ目害虫への高い基礎活性

処理適期が広く、防除タイミングを逃さない

3

浸透移行性に優れ、更に残効が長い

少水量散布でも効果変動少なく安定

作用経路

◎接触毒
体表への
直接付着



◎食毒
有効成分が
付着した植物
を摂食

スピネトラムは接触毒だけでなく、食毒効果もありますので、スピネトラムが害虫に直接暴露されなくても、スピネトラムが付着している植物を害虫が摂食すれば薬効を示すことができます。



スピネアタック[®]

農林水産省登録 第 22983 号
成分：スピネトラム 25%
毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包装：100g×10 本



適用害虫名および使用方法

(2014 年 7 月現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤及び スピネトラムを 含む農薬の 総使用回数	使用方法
樹木類	ケムシ類	5,000 倍	200~700L/10a	発生初期	2 回以内	散布
芝	シバツトガ タマナヤガ スジキリヨトウ	5,000~ 10,000 倍	0.3L/m ²			




スピネアタック
(5000 倍)



無処理区

散布 30 日後のシバツトガによる苞被害の様子



アメリカシロヒトリ防除効果

<効果・薬害等の注意>

- 散布液調製後はそのまま放置せず、速やかに使用してください。
- 使用量、使用時期、使用方法等を守ってください。本剤を適用作物群に属する作物又はその新品種に使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してください。尚、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

<安全使用上の注意>

- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをし、衣服を交換してください。作業時の衣服などは他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は取り扱いに十分注意してください。
- 桑葉にかからないようにし、桑葉にかかった場合には使用後約 1 ヶ月間は蚕に給餌しないでください。(蚕毒)
- ミツバチに対し、以下のことに注意してください。
 - ・ 巣箱およびその周辺にかからないようにする。
 - ・ ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - ・ 養蜂地区では周辺への飛散に注意し、危害防止に努める。
- 街路、公園等で使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空容器等は画場などに放置せず、適切に処理してください。

販売



株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 8F
TEL：03-6802-8571、FAX：03-6802-8577

札幌駐在 TEL011(595)7401 FAX011(595)7402 大阪支店 TEL06(6871)1691 FAX06(6871)1811
仙台支店 TEL022(222)9599 FAX022(267)6505 福岡営業所 TEL・FAX：大阪支店にて代行受付
東京支店 TEL03(6802)8943 FAX03(6802)8953 グリーン研究所 TEL0538(58)1282 FAX0538(58)1714
静岡支店 TEL054(283)5555 FAX054(284)1769 福田工場 TEL0538(58)5108 FAX0538(55)5104
名古屋支店 TEL052(218)3060 FAX052(218)3061

パートナーショップ