

芝生用除草剤

農林水産省登録
第23395号

理研 **タスク[®]39DF**




コケ類に即効!

規格：30g×10袋

 株式会社 理研グリーン

®：「タスク」はエフエムシー・コーポレーションの登録商標

特長① コケ類に対して即効的な効果を発揮します。



薬量：タスク 39DF 0.045g/㎡ (水量：200ml/㎡)
試験場所：(株)理研グリーン グリーン研究所

特長② 反復処理でコケ類の大幅な密度低減が可能です。



左：無処理区 右：タスク 39DF (0.045g/㎡ 2回処理区)

処理日：2013年4月16日、5月24日
調査日：2013年6月24日
試験場所：奈良県ゴルフ場（パッティンググリーン）
散布水量：200ml/㎡

上手な使い方

- ①生育旺盛なコケ類に対しては、10～14日間隔で2～3回処理願います。
- ②ベントの生長シーズン（春季）に本剤を処理すると、コケ類の衰退部分をベントが被覆していくため、ターフが綺麗に仕上がります。
- ③展着剤との混用は避けてください。（薬害）

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	カルフェントラゾンエチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	コケ類	芝生育期 (コケ生育期)	30～60 g/10a	100～200 L/10a	6回以内	雑草茎葉散布	6回以内



効果・薬害等の注意

- (1) 希釈後、よくかきまぜてから散布してください。
- (2) 日本芝に薬害を生じるおそれがあるので、ベントグラスと日本芝が隣接する場所では日本芝にかからないように注意して散布してください。
- (3) 周辺の植物にかかる薬害を生じるので、草花や花木、畑作物の付近での散布は避けてください。
- (4) 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●使用前にラベルをよく読む。●ラベルの記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さない。空袋は圃場などに放置せず水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。



安全使用上の注意事項



- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の指導を受けてください。
- (2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
- (3) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- (4) かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分注意してください。
- (5) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所。

緑をつくり、育て、守る。

販売元



株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 8階
TEL.03-6802-8571 FAX.03-6802-8577 <http://www.rikengreen.co.jp>

札幌駐在 TEL.011-595-7401 FAX.011-595-7402 大阪支店 TEL.06-6871-1691 FAX.06-6871-1811
仙台支店 TEL.022-222-9599 FAX.022-267-6505 福岡営業所（大阪支店にて代行受付）
東京支店 TEL.03-6802-8943 FAX.03-6802-8953 グリーン研究所 TEL.0538-58-1282 FAX.0538-58-1714
静岡支店 TEL.054-283-5555 FAX.054-284-1769 福田工場 TEL.0538-55-5108 FAX.0538-55-5104
名古屋支店 TEL.052-218-3060 FAX.052-218-3061

(株) 理研グリーン・パートナーショップ