



トップチョイス フロアブル

//// 殺虫剤

芝用

新規作用性のフィプロニルが効く

適用病害及び使用方法

- シバツトガに対する推奨薬量：0.05mℓ / m²（希釈倍率4,000倍/水量200mℓ / m²）
- ケラに対する推奨薬量：0.0625mℓ / m²（希釈倍率8,000倍/水量500mℓ / m²）

有効成分と性状

種 類	フィプロニル水和剤
製品名	トップチョイスフロアブル
有効成分の種類及び含有量	(±)-5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-p-トルイル)-4-トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル………9.1%
その他の成分の種類及び含有量	水、界面活性剤等………90.9%
性 状	類白色水和性粘稠懸濁液体
毒 性	劇物
荷 姿	250mℓ × 4

人畜・魚介類に対する安全性（製剤）

人 畜 毒 性	急性経口	ラット	LD ₅₀ >539—<1,183mg/kg
	急性経皮	ラット	LD ₅₀ >2,000mg/kg
	皮膚刺激性	ウサギ	わずかな刺激効果
	眼への刺激	ウサギ	わずかな刺激効果
水産動植物に対する影響	皮膚感受性	モルモット	感受性なし
	コイ		LC ₅₀ (96hr) = 7.8mg/ℓ
	オオミジンコ		EC ₅₀ (48hr) = 0.72mg/ℓ
	藻類（緑藻）		EC ₅₀ = 0.068mg/ℓ


⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

- 桑葉にかからないようにしてください(蚕害)。
- ミツバチを放飼している地域では使用をさけてくだ



バイエルクロップサイエンスでは、将来の世代のニーズを損なうことなく
現代のニーズを満たす「持続可能な発展」のため、Protecting Tomorrow ... Todayをモットーに
① 人の健康と福祉 ② 自然との共存 ③ 市場・社会とのパートナーシップ
を柱として様々な活動を実施しています。



- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

お問合わせ先

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
【お客様相談室】 ☎ 0120-575-078 FAX : 03-3218-3068
受付時間 平日 9:00-12:00 / 13:00-17:00
ホームページ
www.environmentalscience.bayer.jp