

根まで枯らし長〜く抑える除草剤


農林水産省登録  
第 23438 号

# 除草剤 ワイドウェイ® EX 粒剤

農薬の種類 : シアナジン・DCBN・DCMU 粒剤

有効成分 : シアナジン 2.0%、DCBN 3.0%、DCMU 6.0%

性状 : 類白色水和剤細粒



包装 : 2.5kg × 8

人畜毒性:普通物 (毒劇物に該当しないものを指している通称)		
急性経口	マウス(♂♀)	>5000mg/kg
急性経皮	ラット(♂♀)	>2000mg/kg
皮膚刺激性	ウサギ	非常に軽度
眼刺激性	ウサギ	軽度
水性環境影響		
コイルC <sub>50</sub> (96hr)		190mg/L
オオミジンコEC <sub>50</sub> (48hr)		60mg/L
緑藻類 EbC50(0h-72h)		0.13mg/L

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	使用方法	総使用回数※
樹木等	公園、庭園、堤とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、鉄道等	一年生雑草	雑草発生前 〜生育初期 (草丈 20cm 以下)	7.5~15kg /10a	植栽地を 除く樹木等 の周辺地に 全面土壌散布	3 回以内
		多年生広葉雑草 スギナ		15~20kg /10a		

※本剤及び有効成分(シアナジン、DCBN、DCMU)を含む農薬の総使用回数

## ◆特長

本剤はスギナ、エノコログサ、ヨモギ等に効果の高い、作用性が異なる有効成分を混合した非選択性除草剤です。雑草の発生前から草丈 20cm までの処理で、根・茎・葉から吸収してすぐれた効果を発揮します。セイタカアワダチソウや枯れにくい雑草などには、登録使用量の範囲内で適宜薬量を増量し株元に多目に散布することで、根まで枯らし長く効果が持続します。

### ⚠ 効果薬害等の注意

- 本剤は雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので、雑草発生前〜生育期(草丈 20cm 以下)、あるいは雑草を刈り払った後早めに散布してください。
- 多年生イネ科雑草には効果が劣るので、これらの優占する場所での使用は避けてください。
- 土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、土壌が適度の水分を含んでいるときに使用してください。
- 樹木などの周辺では樹冠下より 1m 以上離して使用してください。
- 激しい降雨が予想される場合は使用を避けてください。
- 飛散、流出によって有用植物に薬害が生じることのないように十分注意してください。植栽または播種予定地では使用しないでください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法をあくまらなよう注意してください。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして衣服を換えてください。作業衣の衣服などは他と分けて洗濯してください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 散布に当たっては、小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう少なくともその当日は散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、居住者、通行人、家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 水源地、養殖池、池、河川、水槽などに飛散、流入しないよう十分注意してください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管・・・密封し、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼・乾燥した所。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。