

理研 ファンターフ® 顆粒水和剤

- ダラースポット病に卓効！
- 芝に対する高い安全性
- 芝に速やかに吸収され浸透移行します




適用病害および使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数*
西洋芝（ベントグラス）	ドレクスレラ葉枯病	400倍	0.1ℓ/㎡	発病初期	散布	5回以内
		2000倍				
	炭疽病	2000～4000倍	0.5ℓ/㎡			
西洋芝（ブルーグラス）	ダラースポット病	400倍	0.1ℓ/㎡			
日本芝（こうらいしば）	カーブラリア葉枯病	2000～4000倍	0.5ℓ/㎡			

※本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

●ダラースポット病に対する効果

散布日
2012年6月15日
(処理時：多発生)




無処理

理研 ファンターフ®
2000倍 0.5ℓ/㎡

対照A剤

1000倍 0.5ℓ/㎡

●ドレクスレラ葉枯病に対する効果



試験場所：静岡県ゴルフ場 練習場ベントグリーン

試験規模：4㎡/区、2反復

散布日：2008年6月10日(処理時：小発生)

散布水量：0.5ℓ/㎡

散布方法：園芸用細目ジョロにて散布

調査日：2008年6月20日(散布10日後)

調査方法：発病面積率(%)を達観調査し、無処理区との相対的な減少率(%)を算出

備考：病害の特性上、全面に均一に発生する状況ではなく、局所的に多く発生している箇所もあった

(社内試験)