



# バシパッチ<sup>®</sup>水和剤


適用病害ナビ 

- ブラウン
- ダラー
- 炭疽
- 立枯
- 雪腐
- 犬の足
- 象の足
- 春はげ
- ラージ

バシッと抑える力強さ!



◆主な病害の発生活消長と防除適期



株式会社 理研グリーン

# バンシパッチ®水和剤

(包装規格:1kg×5)

種類名：プロピコナゾール・メプロニル水和剤  
 有効成分：1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール ……4%  
 3'-イソプロポキシ-2-メチルベンズアニリド ……50%  
 その他成分：鉱物質微粉、界面活性剤等 ……46%  
 性状：類白色水和性粉末 45μm以下  
 安全性(製剤)：人畜毒性 普通物  
 : 魚毒性 B類相当

## ●適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数	メプロニルを含む農薬の総使用回数
ベントグラス	葉腐病 (ブラウンパッチ)	500~1,000	発病初期	4回以内	1㎡当り 1ℓ 散布	6回以内	8回以内
	ダラスポット病						
	立枯病 (テイクオールパッチ)	500					
	炭疽病						
	雪腐小粒菌核病						
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	500~1,000	発病初期	4回以内	1㎡当り 1ℓ 散布	6回以内	8回以内
	ヘルミントスポリウム 葉枯病	500~1,500					
	疑似葉腐病 (象の足跡)	1,000					
	疑似葉腐病 (春はげ症)	500~1,000	休眠期前 及び萌芽前				

## ⚠ 効果・薬害等の注意

- ベントグラスに使用する場合、夏期高温時に連用散布すると軽微な葉茎の濃緑色化および褐変を生ずることがあるので注意すること。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にはかからないように注意して散布すること。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当を受けること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

保管：直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。  
 魚毒性：本剤は魚介類に影響を及ぼすが通常の使用方法では問題ない。

★使用前にラベルをよく読む。★ラベルの記載以外には使用しない。★小児の手の届くところに置かない。  
 ●使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。



〒110-0005 東京都台東区上野 2-12-20 NDKロータスビル3階  
 TEL.03-3833-6321 FAX.03-3833-6325 <http://www.rikengreen.co.jp>

仙台支店 TEL.022-222-9599 FAX.022-267-6505 大阪支店 TEL.06-6871-1691 FAX.06-6871-1811  
 東京支店 TEL.03-3835-8134 FAX.03-3833-6325 福岡営業所 TEL.092-752-8391 FAX.092-752-8392  
 静岡支店 TEL.054-283-5555 FAX.054-284-1769 グリーン研究所 TEL.0538-58-1282 FAX.0538-58-1714  
 名古屋支店 TEL.052-262-2861 FAX.052-251-3495 福田工場 TEL.0538-55-5108 FAX.0538-55-5104

理研グリーン・パートナーショップ