

ダラーキック®

プロシモン水和剤 殺菌剤分類 2

Golf Course

- 異なる作用機作
DMI系、SDHI系、Qol系、MBC系とは異なる作用機作のためローテーション散布に組み込めます
- ダラースポット病に優れた効果
ダラースポット病に高い抗菌活性を示し専用剤として使用可能です
- 優れた浸透移行性と長い残効性
予防効果と治癒効果を兼ね備え、長い残効性により、病害管理にゆとりがもてます


試験場所：兵庫県ゴルフ場 散布日：2013年5月15日 草種：ベントグラス

ダラースポット病に対する効果(現地試験)

処理時

処理7日後

処理15日後



ダラーキック 200倍 0.2L/m²

A剤 400倍 0.1L/m²

無処理

ダラーキック：処理7日後でスポットが被覆され始め、処理15日後ではさらに被覆が進んでいた。

芝生用
殺菌剤



レインボー薬品株式会社

芝生用殺菌剤

ダラーキック®

農林水産省登録 第23329号
成分: プロシミドン(化管法1種) 50.0%
 鉱物質微粉、界面活性剤等 50.0%
 (ドデシル硫酸ナトリウム(化管法1種) 2.2%)
性状: 類白色水和性粉末 63μm以下
毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
包装: 500g×10袋


適用病害と使用方法

(2024年7月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
西洋芝 (ベントグラス)	ダラースポット病	200～400倍	0.2ℓ/㎡	発病初期	散布	本剤及び プロシミドンを含 む農薬
日本芝 (こうらいしば)						2回以内

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。


使用時期カレンダー



委託試験成績

ダラースポット病への治療効果

試験実施場所: 兵庫県



草種: ベントグラス 散布日: 2012年5月7日、5月21日
発生: 中～多 調査: 6月4日に発病面積率を調査
●ダラースポット病に対して対照に優る効果を示した

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所。

⚠ 効果・薬害等の注意

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ・散布液調製後はそのまま放置せず、速やかに使用する。
- ・石灰硫黄合剤、ボルドー液など強アルカリ性薬剤との混用はさける。
- ・あぶらな科作物(特に白菜、だいこん、ストック)にはかからないようにする(薬害)
- ・過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用をする(耐性菌出現回避)

⚠ 安全使用上の注意

- ・眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける(刺激性)
- ・皮ふに付着しないように注意。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落とす(刺激性)
- ・散布時は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして洗眼する。
- ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

■ラベルをよく読む ■記載以外には使用しない ■小児の手の届く所には置かない

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000