芝生用除草剤

農林水産省登録
第 15339 号

理研 MCPP 液剤

理研 MCPP 液剤の特長

●シロツメクサなどの広葉雑草に対して優れた除草効果を示します。
●やっかいなスギナの防除にもオススメです。
●茎葉処理（雑草の葉に付着させる）タイプの除草です。
●処理適期幅が広いため、使い勝手に優れます。
●土壌中で速やかに分解する薬剤です。

芝生に発生する主な雑草

シロツメクサ

スギナ

ヒメオドリコソウ

タネツケバナ

ヒメジョオン

ヒメムカシヨモギ

製造
販売元
緑をつくり、育て、守る
株式会社 理研グリーン

理研 MCPP 液剤の適用雑草と使用方法

（2023 年 12 月現在 ）

作物名	作物・場所	雑草名	時期	薬量（10a 当り）	希釈水量（10a 当り）	使用方法
日本芝、西洋芝（ブルーグラス）	―	クローバー及び畑地一年生広葉雑草	雑草生育期	500~1000 ㎖	100~200 ℓ	全面茎葉散布
樹木等	公園、庭園堤とう、駐車場道路、運動場宅地、のり面鉄道等	スギナ	雑草生育期	750~1000 ㎖	100~200 ℓ	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面茎葉散布

本剤および MCPP を含む農薬の総使用回数：3 回以内

一年生広葉雑草の発生消長と散布適期（モデル）



日本芝、西洋芝での理研 MCPP 液剤の使用量：500 ～ 1000 ㎖ /10a 、散布水量：100 ～ 200 ℓ /10a （100 倍～ 200 倍希釈）
※100 ㎡に使用する場合：10 ℓ の水に理研 MCPP 液剤を 50 ～ 100cc 加えて撹拌してください。

上手な使い方と使用上の注意

- 本薬剤は雑草の葉に薬液が付着することで効果が得られます。 散布は霧状になる散布器具を使用してください。
- なるべく雑草が成熟する前までに散布してください。 雑草が成熟（例えば茎が木化）すると十分な除草効果が得られない場合があります。
- 大きい雑草に散布した場合は散布後 1 週間くらいで刈込みをしてください。
- 散布後 1 日以内に雨が予想される場合には散布しないでください。
- 周辺の花木にかからないよう注意してください。
- 低温時（10℃以下）では効果が劣るので使用を避けてください。

◆芝生で使用する場合

- ジョロなど散布液が粗くなる器具では散布しないでください。 十分な効果が得られないだけでなく、 芝生への薬害が発生する危険があります。
- 夏期高温時には一時的に芝が黄変することがあります。

安全使用上の注意
- 誤飲などのないよう注意してください。
- 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。 眼に入った場合は 直ちに水洗し、 眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、 手袋、 長ズボン、 長袖の作業衣などを着用してください。 作業後は手足、 顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園、 堤とう等で使用する場合には、 小児や散布に関係のない者が作業現場に近づかないよう配慮するとともに居住者、 通行人、 家畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。 また散布後にあっても、 少なくともその当日は散布区域に立ち入らないように縄囲いや立札を立てるなど配慮してください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

製造
販売元
緑をつくり、育て、守る。
株式会社 理研グリーン
〒110-8520 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 8F
TEL.03(6802)8571 FAX.03(6802)8577 https://www.rikengreen.co.jp

札幌駐在（仙台支店にて代行受付）
仙台支店 TEL.022(222)9599 FAX.022(267)6505
東京支店 TEL.03(6802)8943 FAX.03(6802)8953
静岡支店 TEL.054(283)0691 FAX.054(291)4261
名古屋支店 TEL.052(218)3060 FAX.052(218)3061
大阪支店 TEL.06(6871)1691 FAX.06(6871)1811
福岡駐在（大阪支店にて代行受付）