

Forest

殺虫剤分類 4A

農林水産省登録 第22392号

ヤシマモリエート[®] マイクロカプセル

クロチアニジンマイクロカプセル剤

優れた後食防止効果を
マイクロカプセル化で
更に長く



6.7ℓ入

モリエートは住友化学(株)の登録商標



レインボー薬品株式会社

優れた後食防止効果

ヤシマモリエート® マイクロカプセル

農林水産省登録 第22392号
成分：クロチアニジン(化管法1種)…………… 7.5%
水等…………… 92.5%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包装：6.7ℓ×2
有効年限：3年

適用害虫と使用方法

(2023年5月現在の登録内容)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ成虫	100～200倍	3ℓ/本 (樹高10m)	成虫の 発生初期	散布	本剤及び クロチアニジンを 含む農薬 4回以内
		15倍	3ℓ/10a		無人ヘリコプター による散布	

※は本剤及び本有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

特長

優れた
後食防止
効果


マイクロ
カプセル
製剤

臭いが
少ない

長い
残効性

基礎試験 2008年(自社試験・茨城県)

モリエートのマイクロカプセル化による効果



試験方法：300ppm薬液を散布8週間後に枝を採取し、マツノマダラカミキリに与えて7日間の累積殺虫率(死虫+苦悶虫)を調査。

△ 効果・薬害等の注意

- ・使用前によく振って使用する。
- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ・激しい降雨の予想される場合は使用をさける(効果)
- ・マツノマダラカミキリ成虫防除は後食防止を目的とするものであり、成虫の発生初期に時期を失ないように散布する(効果)
- ・無人ヘリ散布の注意
 - ◆各散布機種の散布基準に従う。
 - ◆散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - ◆散布液が漏れないように機体の配管、散布装置を十分点検する。
- ・散布液量は、樹高10mのまつ1本当たり3ℓを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面に散布する(効果)
- ・使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

△ 安全使用上の注意

- ・桑葉にかからないように注意(蚕毒)
- ・ミツバチに対する注意
 - ◆巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しない。
 - ◆養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努める。
- ・散布器具、容器の洗浄水は河川等には流さない。空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- ・街路、公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後(最局限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

魚毒性等…使用残りの薬液が生じないように調製し、使いきる。
散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。
また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

■使用前にはラベルをよく読む。

■ラベルの記載以外には使用しない。

■小児の手の届く所には置かない。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000