

シヤルマツト[®]水和剤

適用病害ナビ

ブラウン

ダラー

炭疽

イエロー

ラージ

象の足

春はげ

立枯

紅色雪

雪腐

リング

さび

いつでも使えるオールラウンダー！



炭疽病



ダラースポット病



ブラウンパッチ




紅色雪腐病



イエローパッチ

◆主な病害の発生消長と防除適期



株式会社 理研グリーン

®:登録商標

種類名:ペノミル・メプロニル水和剤
 有効成分:メチル-1-(プチルカルバモイル)-2-ベンゾイミダゾールカーバメート…… 15%
 3'-イソプロポキシ-2-メチルベンズアニリド…………… 60%
 その他成分:鉱物質微粉、界面活性剤等…………… 25%
 性状:類白色水和性粉末 45μm以下
 安全性(製剤):人畜毒性 普通物 :魚毒性 B類相当

●適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペノミルを含む農薬の総使用回数	メプロニルを含む農薬の総使用回数
ライグラス	さび病	600	発病初期	4回以内	1㎡当り 1~2ℓ 散布	6回以内	8回以内
日本芝	疑似葉腐病 (象の足跡)	1,000					
	疑似葉腐病 (春はげ症)	600~1,000	休眠期前				
	葉腐病 (ラージパッチ)						
ベントグラス	フェアリーリング病	600	発病初期		1㎡当り5ℓ 散布		
	炭疽病 立枯病 (テイクオールパッチ)		秋~春期		1㎡当り 1~2ℓ 散布		
	疑似葉腐病 (イエローパッチ)						
	ダラースポット病 葉腐病 (ブラウンパッチ)		発病初期				
ブルーグラス	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	100~150	根雪前	1㎡当り0.2ℓ 散布			

⚠ 効果、薬害等の注意

- 芝草の雪腐病に使用する場合、根雪近くに散布すること。
- 本剤を芝草に使用する場合、夏季高温時の連続散布はベントグラスに軽微な茎葉の黄化を生ずることがあるので注意すること。
- 本剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果が劣ることがあるので、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤を組み合わせで輪番で使用する。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にはかからないように注意して散布すること。
- 飼料作物には使用しないこと。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合には直ちに水洗いすること。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意すること。万一付着した場合には直ちに石鹸でよく洗い落とすこと。
- 散布の際はマスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は手足、顔などを石鹸でよく洗うがいをすること。
- 作業時に使用した衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

保管:直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。
 魚毒性:本剤は水産動物に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用には十分注意すること。

★使用前にラベルをよく読む。★ラベルの記載以外には使用しない。★小児の手の届くところに置かない。
 ●使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ること。空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。



〒110-0005 東京都台東区上野 2-12-20 NDKロータスビル3階
 TEL.03-3833-6321 FAX.03-3833-6325 <http://www.rikengreen.co.jp>

仙台支店 TEL.022-222-9599 FAX.022-267-6505 大阪支店 TEL.06-6871-1691 FAX.06-6871-1811
 東京支店 TEL.03-3835-8134 FAX.03-3833-6325 福岡営業所 TEL.092-752-8391 FAX.092-752-8392
 静岡支店 TEL.054-283-5555 FAX.054-284-1769 グリーン研究所 TEL.0538-58-1282 FAX.0538-58-1714
 名古屋支店 TEL.052-262-2861 FAX.052-251-3495 福田工場 TEL.0538-55-5108 FAX.0538-55-5104

理研グリーン・パートナーショップ